

URGENCE!

- Le temps est un facteur déterminant dans l'efficacité du traitement: plus tôt il est pris, plus efficace il sera. L'idéal est de le recevoir le plus rapidement possible et au maximum 72h après la prise de risque, une rupture ou un glissement de préservatif. En effet, ce traitement a pour objectif de détruire le virus avant que celui-ci ne franchisse les barrières de protection de l'organisme.

- Si vous êtes hors délais, rendez vous chez votre médecin ou dans un centre de référence pour faire un premier bilan.

OÙ OBTENIR LE TPE?

SERVICES D'URGENCES

Plus d'infos sur le TPE dans chaque hôpital:

02 535 40 55 Hôpital St-Pierre
02 555 45 00 ULB-Erasme
02 764 16 02 St-Luc/UCL
02 477 51 00/1 UZ VUB
071 92 34 33 CHU Charleroi
04 366 77 11 CHU de Liège
03 216 08 65 ITG Anvers
09 332 5024 UZ Gand
016 34 39 00 UZ Leuven

NOUS SOUTENIR

Devenir bénévole.

Faire un don:

tout don d'au moins 40€ est fiscalement déductible.
(BE68 0682 2608 8334)

EXÆQUO

Rue Locquenghien, 41
B-1000 Bruxelles
T 02 736 28 61
F 02 733 96 17
info@exaequo.be

Plus d'infos sur:
www.exaequo.be



TPE

TRAITEMENT POST-EXPOSITION AU VIH



J'AI PRIS UN RISQUE HIER SOIR...

É.R.: M. Noël - Rue Locquenghien, 41 - B-1000 Bruxelles / mai 2011
Graphisme: Kihnap your designer / Photo: Zorislav Stojanovic ©

exaequo



Partenaire de ma
sexualité protégée

**SI VOUS PENSEZ AVOIR EU
UNE RELATION SEXUELLE À
RISQUE, IL EST IMPORTANT
D'AGIR RAPIDEMENT !**

**RENDEZ-VOUS DANS UN
CENTRE DE RÉFÉRENCE SIDA
OU AU SERVICE D'URGENCE
DU CENTRE DE RÉFÉRENCE
OÙ UN MÉDECIN FERA UNE
ÉVALUATION DU RISQUE
ET, DANS CERTAINS CAS,
VOUS PRESCRIRA UN
TRAITEMENT D'URGENCE.**

**CHAQUE SITUATION EST
TOUJOURS ANALYSÉE ET
ÉVALUÉE DE MANIÈRE
INDIVIDUELLE.**

ATTENTION !

- Ce traitement est prescrit par le médecin de la salle d'urgence ou du centre de référence sida sous certaines conditions. La prescription se fait après un entretien avec le médecin qui lui permettra d'analyser le risque de contamination par le virus. Ce traitement est aujourd'hui gratuit pour le patient indépendamment de sa « couverture mutuelle ». Seuls les consultations et les frais médicaux divers (prise de sang, éventuelle prise en charge psychologique, etc.) restent à charge du patient.

- Ce traitement doit être pris le plus rapidement possible, idéalement dans les quelques heures qui suivent la prise de risque (et au grand maximum 72h après), une

rupture ou un glissement de préservatif. Plus vite le traitement est pris, plus il a de chances d'être efficace.

- Ce traitement n'est indiqué que pour un risque isolé et exceptionnel.

- Il s'agit d'un traitement lourd qui doit être pris durant 4 semaines avec un suivi médical et des prises de sang réparties sur 6 mois.

- Même si on présume qu'il peut fortement empêcher une contamination, son efficacité n'a pas été démontrée formellement.

PARTENAIRE

Dans la mesure du possible, emmenez avec vous le partenaire avec qui le risque a eu lieu,

afin qu'il puisse répondre à certaines questions importantes du médecin.

DIFFICULTÉS

Ce traitement est lourd et fonctionne comme une trithérapie durant 4 semaines avec des effets secondaires éventuels (nausées, vomissements, maux de tête, etc.). Un suivi médical durant 6 mois est également nécessaire.

Ce traitement n'est valable que pour le VIH et n'a aucune action sur les autres IST (syphilis, gonorrhée, ...). À noter que la délivrance du TPE s'accompagne toujours

d'un dépistage des autres IST ainsi que d'un test VIH.

Le recours au traitement post-exposition doit rester exceptionnel. Il ne peut pas être considéré comme un moyen d'avoir des relations sexuelles non protégées.

**LE PRÉSERVATIF AVEC DU
GEL LUBRIFIANT RESTE LE
MOYEN LE PLUS SÛR POUR
VOUS PROTÉGER DU VIH/
SIDA ET DES AUTRES IST.**